

(2) 薬物乱用をやめて何年か経過した後、何かのきっかけで中毒におちいった時の状態に引き戻されることを (フラッシュバック) という。

(3) 実在しないものが見えたり、虫が皮膚内を動き回っているような不快感におそわれたりするなどの症状を (幻覚) という。

(4) 主な乱用薬物には、(シンナー)、トルエンなどの有機溶剤、(覚醒剤)、大麻、コカインなどがある。

(5) 次の薬物の種類について、A群から呼び名、B群から主な症状を 選んで 記号で 答えなさい。

- ① 大麻 ... A (a, c, g) B (あ)
- ② 有機溶剤 ... A (b, d) B (い)
- ③ 覚醒剤 ... A (e, f, h) B (う)

A群. a. チョコ b. アンパン c. ハシシユ d. シュントロ
 e. スポード f. エス g. ハルパ h. アイス

B群 あ... 心拍数の増加、目の充血、白血球減少、
 免疫力の低下
 い... 幻覚、妄想、意識障害、延髄腫瘍による突然死
 う... 強い依存性、興奮作用、睡眠欲求・食欲、
 疲労感の低下

(6) 未成年者が お酒などを始める きっかけとして 影響がある 社会環境を 二つ 答えなさい。

- (新聞・雑誌・インターネットなどの宣伝、広告)
- (手に入りやすい環境)